



**RESUMEN DE PRENSA
12 DE AGOSTO DE 2015**



Adoración Nieto, investigadora. / El Correo

Solo el 50% de los casos de cáncer de piel se reproducen tras 5 años

C. S.
SEVILLA

► Un estudio de la **Universidad de Sevilla**, en colaboración con el hospital Virgen Macarena, afirma que una vez pasados cinco años del primer diagnóstico de cáncer de piel la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer cutáneo desciende a la mitad.

El estudio ha seguido durante una década a casi 1.000 pacientes y se ha comprobado que los tres primeros años son claves, disminuyendo a partir de entonces la probabilidad anual de un segundo cáncer cutáneo no melanoma, que transcurridos cinco años se reduce a la mitad.



El 44% del segundo cáncer de piel no melanoma se diagnostica a los dos años

El 44 por ciento de los casos de un segundo cáncer de piel no melanoma se diagnostica dos años después de haberse diagnosticado el primero, según los resultados de un trabajo desarrollado por la **Universidad de Sevilla** en colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Dos de cada diez pacientes diagnosticados con un cáncer de piel no melanoma presentaron un segundo cáncer y de éstos, el 44 por ciento fueron detectados en los dos años posteriores al primer diagnóstico, según este trabajo.

La investigación ha seguido durante una década a casi mil pacientes diagnosticados por esta patología en dicho hospital sevillano entre 1998 y 2000 y se ha comprobado que los tres primeros años son claves para detectar otra lesión cutánea, disminuyendo a partir de entonces la probabilidad anual de un segundo cáncer cutáneo no melanoma, que transcurridos cinco años se reduce a la mitad, ha informado un comunicado de la universidad hispalense.

"Es importante hacer un seguimiento del paciente durante los cinco años posteriores a sufrir el primer cáncer de piel no melanoma porque así detectaremos precozmente el setenta y ocho por ciento de los segundos cánceres", ha explicado la profesora de la Universidad de Sevilla Adoración Nieto, investigadora del estudio junto a David Moreno, Javier Domínguez y Juan José Ríos.

Respecto a la predisposición por sexos para sufrir un segundo cáncer cutáneo no melanoma, los investigadores aseguran que no hay una diferencia significativa, aunque es menos frecuente que se produzca en mujeres, "quizás porque tras sufrir una primera lesión se cuidan más que los varones".

Los pacientes mayores de 60 años y aquellos cuyas lesiones se localizan en las extremidades, muestran un mayor riesgo, estadísticamente significativo, de un segundo cáncer cutáneo no melanoma.

Estos cánceres son tumores malignos de la piel diferentes a los melanomas que engloban dos tipos principales de tumores: carcinomas de células escamosas, epidermoide o espinocelular, y carcinoma de células basales o basocelular.

Aunque estos dos tipos de cáncer de la piel son los cánceres más frecuentes, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) señala que no representan más del 0,1 por ciento de las muertes debidas a cáncer y suelen aparecer en personas de piel clara que han estado expuestos durante mucho tiempo al sol.

En el caso de las personas que han sufrido un melanoma cutáneo que se suele manifestar por cambios en el tamaño, forma, color, bordes o evolución de un lunar ya existente, el Grupo de Investigación de Epidemiología del Cáncer de la universidad sevillana señala que en Andalucía el aumento del número de casos en la última década se acompaña de su detección en fases más tempranas.

"Las mejoras en la referencia de pacientes entre atención primaria y especializada para cumplir con el objetivo del diagnóstico de cáncer en un máximo de 15 días y el uso de la teledermatología, contribuyen a la accesibilidad del paciente a los recursos sanitarios del área de dermatología hospitalaria desde el primer momento en su Centro de Salud y esto posibilita que el especialista pueda diagnosticar precozmente y poner un tratamiento adecuado", ha asegurado Adoración Nieto.

Noticias relacionadas



La probabilidad de sufrir un segundo cáncer de piel no melanoma baja con el tiempo



Un estudio de la Universidad de Sevilla afirma que una vez pasados cinco años del primer diagnóstico la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer cutáneo desciende a la mitad. El estudio arrojó la conclusión de que dos de cada diez pacientes diagnosticados con un cáncer de piel no melanoma presentaron un segundo cáncer y de estos el 44% fueron detectados en los dos años posteriores al primer diagnóstico. El trabajo fue llevado a cabo por la [Universidad de Sevilla](#) en colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena.

En el estudio se ha seguido durante una década a casi 1.000 pacientes diagnosticados en este Hospital entre los años 1998 y 2000 y se ha comprobado que los tres primeros años son claves para detectar otra lesión cutánea, disminuyendo a partir de entonces la probabilidad anual de un segundo cáncer cutáneo no melanoma, que transcurridos cinco años se reduce a la mitad.

"Es importante hacer un seguimiento del paciente durante los cinco años posteriores a sufrir el primer cáncer de piel no melanoma porque así detectaremos precozmente el 78% de los segundos cánceres", defiende la profesora de la Universidad de Sevilla Adoración Nieto, investigadora del estudio junto a David Moreno, Javier Domínguez y Juan José Ríos.

Respecto a la predisposición por sexos para sufrir un segundo cáncer cutáneo no melanoma, los investigadores aseguran que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres, pero sí que es menos frecuente que se produzca en mujeres, "quizás porque tras sufrir una primera lesión se cuidan más que los varones".

Los pacientes mayores de 60 años y aquellos cuyas lesiones se localizan en las extremidades, muestran un mayor riesgo, estadísticamente significativo, de un segundo cáncer cutáneo no melanoma.

Estos cánceres son tumores malignos de la piel diferentes a los melanomas que engloban dos tipos principales de tumores: carcinomas de células escamosas, epidermoide o espinocelular, y carcinoma de células basales o basocelular.

Aunque estos dos tipos de cáncer de la piel son los cánceres más frecuentes, la Asociación Española Contra el Cáncer



(AECC) señala que afortunadamente no

representan más del 0,1% de las muertes debidas a cáncer. Suelen aparecer en personas de piel clara que han estado expuestos durante mucho tiempo al sol. Ambos tumores se tratan con métodos locales (criocirugía, radioterapia, escisión simple) con muchas posibilidades de curación en la mayoría de los casos.

Su diagnóstico y tratamiento precoz es importante para mejorar los resultados terapéuticos, especialmente en áreas estéticas como la cara, en la que puede ser necesario el uso de cirugía combinada con anatomía patológica intraoperatoria -cirugía de Mohs- para conseguir bordes libres del tumor limitando lo más posible el área tratada.

Diagnóstico precoz del melanoma cutáneo

En el caso de las personas que han sufrido un melanoma cutáneo que se suele manifestar por cambios en el tamaño, forma, color, bordes o evolución de un lunar ya existente, el Grupo de Investigación de Epidemiología del Cáncer de la US señala que en Andalucía el aumento del número de casos en la última década, se acompaña de su detección en fases más tempranas.

"Las mejoras en la referencia de pacientes entre atención primaria y especializada para cumplir con el objetivo del diagnóstico de cáncer en un máximo de 15 días y el uso de la teledermatología, contribuyen a la accesibilidad del paciente a los recursos sanitarios del área de dermatología hospitalaria desde el primer momento en su Centro de Salud y esto posibilita que el especialista pueda diagnosticar precozmente y poner un tratamiento adecuado", afirma Adoración Nieto.

Aunque el riesgo de melanoma aumenta con la edad, una característica de este cáncer es la elevada proporción de casos que se diagnostican en menores de 40 años. Sin embargo, son los pacientes mayores de 60 años quienes suelen presentar diagnósticos más tardíos con lesiones más profundas.

Medidas preventivas

Las personas que se exponen de forma excesiva a las radiaciones ultravioletas tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de piel. Los cánceres de piel pueden prevenirse mediante medidas sencillas como evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día (entre las 12 y las 16 horas), utilizar gorras, sombreros o sombrillas para que el sol no llegue a la piel, y aplicar sobre la piel fotoprotectores solares con filtros de protección UVA y UVB adecuados a cada tipo de piel.

"Aunque las características genéticas de cada persona también influyen, evitar la exposición inadecuada al sol o a otras fuentes artificiales de ultravioletas como las

lámparas de las cabinas bronceadoras, ayudará a disminuir la aparición de tumores cutáneos y en el caso del melanoma es especialmente importante evitar la exposición aguda e intermitente al sol, que causa quemaduras solares, sobretodo en la infancia y adolescencia", reitera esta investigadora.



Un estudio de la US asegura que la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer de piel desciende a la mitad

Un estudio de la **Universidad de Sevilla (US)**, en colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena, afirma que una vez pasados cinco años del primer diagnóstico de cáncer de piel la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer cutáneo desciende a la mitad.



Ampliar foto

En un comunicado, la US ha explicado que dos de cada diez pacientes diagnosticados con un cáncer de piel no melanoma presentaron un segundo cáncer, y de estos, el 44 por ciento fueron detectados en los dos años posteriores al primer diagnóstico, según los datos de este trabajo.

En el estudio se ha seguido durante una década a casi 1.000 pacientes diagnosticados en este hospital entre los años 1998 y 2000 y se ha comprobado que los tres primeros años son claves para detectar otra lesión cutánea, disminuyendo a partir de entonces la probabilidad anual de un segundo cáncer cutáneo no melanoma, que transcurridos cinco años se reduce a la mitad.

"Es importante hacer un seguimiento del paciente durante los cinco años posteriores a sufrir el primer cáncer de piel no melanoma porque así detectaremos precozmente el 78 por ciento de los segundos cánceres", ha defendido la profesora de la US, Adoración Nieto, investigadora del estudio junto a David Moreno, Javier Domínguez y Juan José Ríos.

Respecto a la predisposición por sexos para sufrir un segundo cáncer cutáneo no melanoma, los investigadores han asegurado que "no hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres", pero sí que es menos frecuente que se produzca en mujeres, "quizás porque tras sufrir una primera lesión se cuidan más que los varones".

Los pacientes mayores de 60 años y aquellos cuyas lesiones se localizan en las extremidades, "muestran un mayor riesgo, estadísticamente significativo, de un segundo cáncer cutáneo no melanoma", han recalcado.

Estos cánceres son tumores malignos de la piel diferentes a los melanomas que engloban dos tipos principales de tumores, como son carcinomas de células escamosas, epidermoide o espinocelular, y carcinoma de células basales o basocelular.

Aunque estos dos tipos de cáncer de la piel son los cánceres "más frecuentes", la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha señalado que "afortunadamente no representan más del 0,1 por ciento de las muertes debidas a cáncer".

En este sentido, suelen aparecer en personas de piel clara que han estado expuestos durante mucho tiempo al sol. Ambos tumores se tratan con métodos locales (criocirugía, radioterapia, escisión simple) con muchas posibilidades de curación en la mayoría de los casos.

Su diagnóstico y tratamiento precoz es "importante para mejorar los resultados terapéuticos", especialmente en áreas estéticas como la cara, en la que puede ser necesario el uso de cirugía combinada con anatomía patológica intraoperatoria —cirugía de Mohs— para conseguir bordes libres del tumor limitando lo más posible el área tratada.

Diagnóstico precoz del melanoma cutáneo

En el caso de las personas que han sufrido un melanoma cutáneo que se suele manifestar por cambios en el tamaño, forma, color, bordes o evolución de un lunar ya existente, el Grupo de Investigación de Epidemiología del Cáncer de la US señala que en Andalucía el aumento del número de casos en la última década, se acompaña de su detección en fases más tempranas.

"Las mejoras en la referencia de pacientes entre atención primaria y especializada para cumplir con el objetivo del diagnóstico de cáncer en un máximo de 15 días y el uso de la teledermatología, contribuyen a la accesibilidad del paciente a los recursos sanitarios del área de dermatología hospitalaria desde el primer momento en su Centro de Salud y esto posibilita que el especialista pueda diagnosticar precozmente y poner un tratamiento adecuado", ha explicado Nieto.

Aunque el riesgo de melanoma aumenta con la edad, una característica de este cáncer es la elevada proporción de casos que se diagnostican en menores de 40 años. Sin embargo, son los pacientes mayores de 60 años quienes suelen presentar diagnósticos más tardíos con lesiones más profundas.



URL: www.20minutos.es

PAÍS: España

TARIFA: 4898 €

UUM: 3210000

UUD: 379000

TVD: 489800

TMV: 3,5 min



► 11 Agosto, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

Medidas preventivas

Las personas que se exponen de forma excesiva a las radiaciones ultravioletas tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de piel. Los cánceres de piel pueden prevenirse mediante medidas sencillas como evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día (entre las 12 y las 16 horas), utilizar gorras, sombreros o sombrillas para que el sol no llegue a la piel, y aplicar sobre la piel fotoprotectores solares con filtros de protección UVA y UVB adecuados a cada tipo de piel.

"Aunque las características genéticas de cada persona también influyen, evitar la exposición inadecuada al sol o a otras fuentes artificiales de ultravioletas como las lámparas de las cabinas bronceadoras, ayudará a disminuir la aparición de tumores cutáneos y en el caso del melanoma es especialmente importante evitar la exposición aguda e intermitente al sol, que causa quemaduras solares, sobretodo en la infancia y adolescencia", ha concluido la investigadora.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.



Un estudio de la US asegura que la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer de piel desciende a la mitad

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Un estudio de la Universidad de Sevilla (US), en colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena, afirma que una vez pasados cinco años del primer diagnóstico de cáncer de piel la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer cutáneo desciende a la mitad.

En un comunicado, la US ha explicado que dos de cada diez pacientes diagnosticados con un cáncer de piel no melanoma presentaron un segundo cáncer, y de estos, el 44 por ciento fueron detectados en los dos años posteriores al primer diagnóstico, según los datos de este trabajo.

En el estudio se ha seguido durante una década a casi 1.000 pacientes diagnosticados en este hospital entre los años 1998 y 2000 y se ha comprobado que los tres primeros años son claves para detectar otra lesión cutánea, disminuyendo a partir de entonces la probabilidad anual de un segundo cáncer cutáneo no melanoma, que transcurridos cinco años se reduce a la mitad.

"Es importante hacer un seguimiento del paciente durante los cinco años posteriores a sufrir el primer cáncer de piel no melanoma porque así detectaremos precozmente el 78 por ciento de los segundos cánceres", ha defendido la profesora de la US, Adoración Nieto, investigadora del estudio junto a David Moreno, Javier Domínguez y Juan José Ríos.

Respecto a la predisposición por sexos para sufrir un segundo cáncer cutáneo no melanoma, los investigadores han asegurado que "no hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres", pero sí que es menos frecuente que se produzca en mujeres, "quizás porque tras sufrir una primera lesión se cuidan más que los varones".

Los pacientes mayores de 60 años y aquellos cuyas lesiones se localizan en las extremidades, "muestran un mayor riesgo, estadísticamente significativo, de un segundo cáncer cutáneo no melanoma", han recalcado.

Estos cánceres son tumores malignos de la piel diferentes a los melanomas que engloban dos tipos principales de tumores, como son carcinomas de células escamosas, epidermoide o espinocelular, y carcinoma de células basales o basocelular.

Aunque estos dos tipos de cáncer de la piel son los cánceres "más frecuentes", la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha señalado que "afortunadamente no representan más del 0,1 por ciento de las muertes debidas a cáncer".

En este sentido, suelen aparecer en personas de piel clara que han estado expuestos durante mucho tiempo al sol. Ambos tumores se tratan con métodos locales (criocirugía, radioterapia, escisión simple) con muchas posibilidades de curación en la mayoría de los casos.

Su diagnóstico y tratamiento precoz es "importante para mejorar los resultados terapéuticos", especialmente en áreas estéticas como la cara, en la que puede ser necesario el uso de cirugía combinada con anatomía patológica intraoperatoria --cirugía de Mohs-- para conseguir bordes libres del tumor limitando lo más posible el área tratada.

DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL MELANOMA CUTÁNEO

En el caso de las personas que han sufrido un melanoma cutáneo que se suele manifestar por cambios en el tamaño, forma, color, bordes o evolución de un lunar ya existente, el Grupo de Investigación de Epidemiología del Cáncer de la US señala que en Andalucía el aumento del número de casos en la última década, se acompaña de su detección en fases más tempranas.

"Las mejoras en la referencia de pacientes entre atención primaria y especializada para cumplir con el objetivo del diagnóstico de cáncer en un máximo de 15 días y el uso de la teledermatología, contribuyen a la accesibilidad del paciente a los recursos sanitarios del área de dermatología hospitalaria desde el primer momento en su Centro de Salud y esto posibilita que el especialista pueda diagnosticar precozmente y poner un tratamiento adecuado", ha explicado

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un estudio de la US asegura que la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer de piel desciende a la mitad



Foto: EUROPA PRESS/US

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de **la Universidad de Sevilla (US)**, en colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena, afirma que una vez pasados cinco años del primer diagnóstico de cáncer de piel la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer cutáneo desciende a la mitad.

En un comunicado, la US ha explicado que dos de cada diez pacientes diagnosticados con un cáncer de piel no melanoma presentaron un segundo cáncer, y de estos, el 44 por ciento fueron detectados en los dos años posteriores al primer diagnóstico, según los datos de este trabajo.

En el estudio se ha seguido durante una década a casi 1.000 pacientes diagnosticados en este hospital entre los años 1998 y 2000 y se ha comprobado que los tres primeros años son claves para detectar otra lesión cutánea, disminuyendo a partir de entonces la probabilidad anual de un segundo cáncer cutáneo no melanoma, que transcurridos cinco años se reduce a la mitad.

"Es importante hacer un seguimiento del paciente durante los cinco años posteriores a sufrir el primer cáncer de piel no melanoma porque así detectaremos precozmente el 78 por ciento de los segundos cánceres", ha defendido la profesora de la US, **Adoración Nieto**, investigadora del estudio junto a David Moreno, Javier Domínguez y Juan José Ríos.

Respecto a la predisposición por sexos para sufrir un segundo cáncer cutáneo no melanoma, los investigadores han asegurado que "no hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres", pero sí que es menos frecuente que se produzca en mujeres, "quizás porque tras sufrir una primera lesión se cuidan más que los varones".

Los pacientes mayores de 60 años y aquellos cuyas lesiones se localizan en las extremidades, "muestran un mayor riesgo, estadísticamente significativo, de un segundo cáncer cutáneo no melanoma", han recalcado.

Estos cánceres son tumores malignos de la piel diferentes a los melanomas que engloban dos tipos principales de tumores, como son carcinomas de células escamosas, epidermoide o espinocelular, y

carcinoma de células basales o basocelular.

Aunque estos dos tipos de cáncer de la piel son los cánceres "más frecuentes", la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha señalado que "afortunadamente no representan más del 0,1 por ciento de las muertes debidas a cáncer".

En este sentido, suelen aparecer en personas de piel clara que han estado expuestos durante mucho tiempo al sol. Ambos tumores se tratan con métodos locales (criocirugía, radioterapia, escisión simple) con muchas posibilidades de curación en la mayoría de los casos.

Su diagnóstico y tratamiento precoz es "importante para mejorar los resultados terapéuticos", especialmente en áreas estéticas como la cara, en la que puede ser necesario el uso de cirugía combinada con anatomía patológica intraoperatoria --cirugía de Mohs-- para conseguir bordes libres del tumor limitando lo más posible el área tratada.

DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL MELANOMA CUTÁNEO

En el caso de las personas que han sufrido un melanoma cutáneo que se suele manifestar por cambios en el tamaño, forma, color, bordes o evolución de un lunar ya existente, el Grupo de Investigación de Epidemiología del Cáncer de la US señala que en Andalucía el aumento del número de casos en la última década, se acompaña de su detección en fases más tempranas.

"Las mejoras en la referencia de pacientes entre atención primaria y especializada para cumplir con el objetivo del diagnóstico de cáncer en un máximo de 15 días y el uso de la tele dermatología, contribuyen a la accesibilidad del paciente a los recursos sanitarios del área de dermatología hospitalaria desde el primer momento en su Centro de Salud y esto posibilita que el especialista pueda diagnosticar precozmente y poner un tratamiento adecuado", ha explicado Nieto.

Aunque el riesgo de melanoma aumenta con la edad, una característica de este cáncer es la elevada proporción de casos que se diagnostican en menores de 40 años. Sin embargo, son los pacientes mayores de 60 años quienes suelen presentar diagnósticos más tardíos con lesiones más profundas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las personas que se exponen de forma excesiva a las radiaciones ultravioletas tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de piel. Los cánceres de piel pueden prevenirse mediante medidas sencillas como evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día (entre las 12 y las 16 horas), utilizar gorras, sombreros o sombrillas para que el sol no llegue a la piel, y aplicar sobre la piel fotoprotectores solares con filtros de protección UVA y UVB adecuados a cada tipo de piel.

"Aunque las características genéticas de cada persona también influyen, evitar la exposición inadecuada al sol o a otras fuentes artificiales de ultravioletas como las lámparas de las cabinas bronceadoras, ayudará a disminuir la aparición de tumores cutáneos y en el caso del melanoma es especialmente importante evitar la exposición aguda e intermitente al sol, que causa quemaduras solares, sobretodo en la infancia y adolescencia", ha concluido la investigadora.

© 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.



¡Síguenos!

Destacamos ► [Escarlatina](#) [Menopausia](#) [Síndrome Munchausen](#) [Hidrocefalia](#) [Ganglios](#) [Pomelo](#) [Benzodiacepinas](#) [Resiliencia](#) [Piercing](#)

Editado por [europa press](#)

11 de Agosto 2015

infosalus.com

[SALUD](#) [FARMACIA](#) [ACTUALIDAD](#) [MUJER](#) [NUTRICIÓN](#) [ESTÉTICA](#) [ASISTENCIA](#) [MAYORES](#) [ENFERMEDADES](#)

— TRAS CINCO AÑOS DEL PRIMER DIAGNOSTICO —

La probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer de piel desciende a la mitad



Publicado 11/08/2015 14:16:16 CET

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Sevilla (US), en colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena, afirma que una vez pasados cinco años del primer diagnóstico de cáncer de piel la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer cutáneo desciende a la mitad.

La US explica que **dos de cada diez pacientes diagnosticados con un cáncer de piel no melanoma presentaron un segundo cáncer**, y de estos, el 44 por ciento fueron detectados en los dos años posteriores al primer diagnóstico, según los datos de este trabajo.

En el estudio **se ha seguido durante una década a casi 1.000 pacientes** diagnosticados en este hospital entre los años 1998 y 2000 y se ha comprobado que los tres primeros años son claves para detectar otra lesión cutánea. disminuyendo a partir de

Lo más leído en...

Infosalus



1 [Cuidado con los remedios caseros para blanquear los dientes](#)



2 [Dar a luz en tu propia casa, y con cargo a la sanidad pública](#)



3 [Resiliencia en familia para convivir con la discapacidad](#)



4 [¿Te huelen los pies?](#)



5 [Modelos matemáticos para conocer mejor la memoria humana](#)

Hoy

Una semana

Un mes

Últimas noticias de salud



entonces la probabilidad anual de un segundo cáncer cutáneo no melanoma, que transcurridos cinco años se reduce a la mitad.

"Es importante hacer un seguimiento del paciente durante los cinco años posteriores a sufrir el primer cáncer de piel no melanoma porque así detectaremos precozmente el 78 por ciento de los segundos cánceres", ha defendido la profesora de la US, Adoración Nieto, investigadora del estudio junto a David Moreno, Javier Domínguez y Juan José Ríos.

Respecto a la **predisposición por sexos** para sufrir un segundo cáncer cutáneo no melanoma, los investigadores han asegurado que **"no hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres"**, pero sí que es menos frecuente que se produzca en mujeres, "quizás porque tras sufrir una primera lesión se cuidan más que los varones".

Los pacientes mayores de 60 años y aquellos cuyas lesiones se localizan en las extremidades, "muestran un mayor riesgo, estadísticamente significativo, de un segundo cáncer cutáneo no melanoma", han recalcado.

Estos cánceres **son tumores malignos de la piel diferentes a los melanomas** que engloban dos tipos principales de tumores, como son carcinomas de células escamosas, epidermoide o espinocelular, y carcinoma de células basales o basocelular.

Aunque estos dos tipos de cáncer de la piel son los cánceres "más frecuentes", la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha señalado que "afortunadamente no representan más del 0,1 por ciento de las muertes debidas a cáncer".

En este sentido, **suelen aparecer en personas de piel clara que han estado expuestos durante mucho tiempo al sol.** Ambos tumores se tratan con métodos locales (criocirugía, radioterapia, escisión simple) con muchas posibilidades de curación en la mayoría de los casos.

Su diagnóstico y tratamiento precoz es "importante para mejorar los resultados terapéuticos", especialmente en áreas estéticas como la cara, en la que puede ser necesario el uso de cirugía combinada con anatomía patológica intraoperatoria --cirugía de Mohs-- para conseguir bordes libres del tumor limitando lo más posible el área tratada.

DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL MELANOMA CUTÁNEO

En el caso de las personas que han sufrido un melanoma cutáneo que se suele manifestar por cambios en el tamaño, forma, color, bordes o evolución de un lunar ya existente, el Grupo de Investigación de Epidemiología del Cáncer de la US señala que en Andalucía el aumento del número de casos en la última década, se acompaña de su detección en fases más tempranas.

"Las mejoras en la referencia de pacientes entre atención primaria y especializada para cumplir con el objetivo del diagnóstico de cáncer en un máximo de 15 días y el uso de la teledermatología, contribuyen a la accesibilidad del paciente a los recursos sanitarios del área de dermatología hospitalaria desde el primer momento en su Centro de Salud y esto posibilita que el especialista pueda diagnosticar precozmente y poner un tratamiento adecuado", ha explicado Nieto.

Aunque el riesgo de melanoma aumenta con la edad, una característica de este cáncer es la elevada proporción de casos que se diagnostican en menores de 40 años. Sin embargo, son los pacientes mayores de 60 años quienes suelen presentar diagnósticos más tardíos con lesiones más profundas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer de piel desciende a la mitad

Las españolas gastan 803 euros anuales en tratamientos y productos de belleza

Al dentista ¿por estética o por salud?

Los beneficios de la cirugía bariátrica disminuyen a los cinco años

Los trastornos de la conducta alimentaria: cuándo aparecen y cómo superarlos

Cuidado con los remedios caseros para blanquear los dientes



Las personas que se exponen de forma excesiva a las radiaciones ultravioletas tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de piel. Los cánceres de piel pueden prevenirse mediante medidas sencillas como evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día (entre las 12 y las 16 horas), utilizar gorras, sombreros o sombrillas para que el sol no llegue a la piel, y aplicar sobre la piel fotoprotectores solares con filtros de protección UVA y UVB adecuados a cada tipo de piel.

"Aunque las características genéticas de cada persona también influyen, evitar la exposición inadecuada al sol o a otras fuentes artificiales de ultravioletas como las lámparas de las cabinas bronceadoras, ayudará a disminuir la aparición de tumores cutáneos y en el caso del melanoma es especialmente importante evitar la exposición aguda e intermitente al sol, que causa quemaduras solares, sobretudo en la infancia y adolescencia", ha concluido la investigadora.

Directorio: Sevilla Diagnóstico AeCC Melanoma

[Sigue a @infosalus.com](#)

Noticias Recomendadas

Cuidado con los remedios caseros para blanquear los dientes

Dar a luz en tu propia casa, y con cargo a la sanidad...

Resiliencia en familia para convivir con la discapacidad

¿Te huelen los pies?

Uso de cookies

Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su



Un estudio de la US asegura que la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer de piel desciende a la mitad

| 11/08/2015 - 13:19



Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0 votos) Más noticias sobre:
• Sevilla

Medicina

- Hospitales
- Cáncer



Enlaces relacionados

Ayuntamiento de Málaga lidera un estudio para mejorar la rehabilitación de mujeres operadas de cáncer de mama (4/08)

ERYTECH anuncia que la revisión de seguridad del tratamiento de cáncer de páncreas con ERY-ASP, en un estudio de fase II, ha sido positiva (21/07)

Desaconsejan dosificar la quimioterapia para el cáncer de ovario según el tamaño corporal: estudio (13/07)

Seguir a @elecodiario

Un **estudio de la Universidad de Sevilla (US)**, en colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena, afirma que una vez pasados cinco años del primer diagnóstico de cáncer de piel la probabilidad anual de sufrir un segundo cáncer cutáneo desciende a la mitad.

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la US ha explicado que dos de cada diez pacientes diagnosticados con un cáncer de piel no melanoma presentaron un segundo cáncer, y de estos, el 44 por ciento fueron detectados en los dos años posteriores al primer diagnóstico, según los datos de este trabajo.

En el estudio se ha seguido durante una década a casi 1.000 pacientes diagnosticados en este hospital entre los años 1998 y 2000 y se ha comprobado que los tres primeros años son claves para detectar otra lesión cutánea, disminuyendo a partir de entonces la probabilidad anual de un segundo cáncer cutáneo no melanoma, que transcurridos cinco años se reduce a la mitad.

"Es importante hacer un seguimiento del paciente durante los cinco años posteriores a sufrir el primer cáncer de piel no melanoma porque así detectaremos precozmente el 78 por ciento de los segundos cánceres", ha defendido la profesora de la US, **Adoración Nieto**, investigadora del estudio junto a David Moreno, Javier Domínguez y Juan José Ríos.

Respecto a la predisposición por sexos para sufrir un segundo cáncer cutáneo no melanoma, los investigadores han asegurado que "no hay una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres", pero sí que es menos frecuente que se produzca en mujeres, "quizás porque tras sufrir una primera lesión se cuidan más que los varones".

Los pacientes mayores de 60 años y aquellos cuyas lesiones se localizan en las extremidades, "muestran un mayor riesgo, estadísticamente significativo, de un segundo cáncer cutáneo no melanoma", han recalcado.

Estos cánceres son tumores malignos de la piel diferentes a los melanomas que engloban dos tipos principales de tumores, como son carcinomas de células escamosas, epidermoide o espinocelular, y carcinoma de células basales o basocelular.

Aunque estos dos tipos de cáncer de la piel son los cánceres "más frecuentes", la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha señalado que "afortunadamente no representan más del 0,1 por ciento de las muertes debidas a cáncer".

En este sentido, suelen aparecer en personas de piel clara que han estado expuestos durante mucho tiempo al sol. Ambos tumores se tratan con métodos locales (criocirugía, radioterapia, escisión simple) con muchas posibilidades de curación en la mayoría de los casos.

Su diagnóstico y tratamiento precoz es "importante para mejorar los resultados terapéuticos", especialmente en áreas



estéticas como la cara, en la que puede ser necesario el uso de cirugía combinada con anatomía patológica intraoperatoria --cirugía de Mohs-- para conseguir bordes libres del tumor limitando lo más posible el área tratada.

DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL MELANOMA CUTÁNEO

En el caso de las personas que han sufrido un melanoma cutáneo que se suele manifestar por cambios en el tamaño, forma, color, bordes o evolución de un lunar ya existente, el Grupo de Investigación de Epidemiología del Cáncer de la US señala que en Andalucía el aumento del número de casos en la última década, se acompaña de su detección en fases más tempranas.

"Las mejoras en la referencia de pacientes entre atención primaria y especializada para cumplir con el objetivo del diagnóstico de cáncer en un máximo de 15 días y el uso de la teledermatología, contribuyen a la accesibilidad del paciente a los recursos sanitarios del área de dermatología hospitalaria desde el primer momento en su Centro de Salud y esto posibilita que el especialista pueda diagnosticar precozmente y poner un tratamiento adecuado", ha explicado Nieto.

Aunque el riesgo de melanoma aumenta con la edad, una característica de este cáncer es la elevada proporción de casos que se diagnostican en menores de 40 años. Sin embargo, son los pacientes mayores de 60 años quienes suelen presentar diagnósticos más tardíos con lesiones más profundas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las personas que se exponen de forma excesiva a las radiaciones ultravioletas tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de piel. Los cánceres de piel pueden prevenirse mediante medidas sencillas como evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día (entre las 12 y las 16 horas), utilizar gorras, sombreros o sombrillas para que el sol no llegue a la piel, y aplicar sobre la piel fotoprotectores solares con filtros de protección UVA y UVB adecuados a cada tipo de piel.

"Aunque las características genéticas de cada persona también influyen, evitar la exposición inadecuada al sol o a otras fuentes artificiales de ultravioletas como las lámparas de las cabinas bronceadoras, ayudará a disminuir la aparición de tumores cutáneos y en el caso del melanoma es especialmente importante evitar la exposición aguda e intermitente al sol, que causa quemaduras solares, sobretudo en la infancia y adolescencia", ha concluido la investigadora.



► 12 Agosto, 2015



Web de psicología. Un grupo de alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla han desarrollado la página web de psicología y neurociencia Psico-Memorias. Este proyecto cuenta ya con 50.000 visitas tras un año en funcionamiento.



Padres e hijos

Los adolescentes con madres poco cariñosas tienden a un mayor consumo de drogas

Alcoholismo y tabaquismo están ligados a una relación distante con la madre, según un estudio de la **Universidad de Sevilla**. Las relaciones padres-hijos son «muy importantes e influyentes en el consumo de drogas. De esta forma, los jóvenes que viven en una familia poco cohesionada tienden a consumir más alcohol, tabaco o cannabis», apuntan los investigadores. El objetivo del estudio es elaborar una guía de orientación para mejorar las relaciones de los jóvenes.



Los jóvenes con familias más cohesionadas consumen menos drogas

UCC+i US | Seguir a @cienciaUS | 11 agosto 2015 12:10



Un grupo de expertos de las **Facultades de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (US)** ha llevado a cabo una investigación longitudinal a lo largo de diez años en los que han entrevistado a 90 estudiantes de la provincia de Sevilla cuando tenían 13, 15, 17 y 21 años. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la evolución de estos adolescentes, de entornos rurales y urbanos y de distintos niveles socioeconómicos, hasta llegar a la adultez emergente.

Entre sus conclusiones los expertos destacan que las relaciones con sus padres son "muy importantes" para los hijos en esta edad y que el consumo de drogas aumenta más en las familias menos cohesionadas.

Para este trabajo los expertos han aplicado una nueva técnica de análisis estadístico multinivel que aumenta la fiabilidad de los resultados.

En España, para tener un buen desarrollo los jóvenes no necesitan distanciarse emocionalmente de sus padres y madres, como sí ocurre en EEUU o países anglosajones

"Hemos observado que en España, para tener un buen desarrollo los jóvenes no necesitan distanciarse emocionalmente de sus padres y madres cosa que sí ocurre en otros lugares del mundo como EEUU o países anglosajones donde la autonomía emocional es más necesaria", afirman las profesoras de la Universidad de Sevilla Águeda Parra e Inmaculada Sánchez.

En líneas generales, "la relación con la familia durante esta etapa es positiva, sin grandes conflictos y con un nivel razonable de comunicación con los padres que mejora conforme los jóvenes se van haciendo mayores", señala Parra.

¿Qué ocurre con este grupo de población de entre 18 y 30 años en España?

Estas investigadoras del Grupo de Investigación Procesos de Desarrollo y Educación en Contextos Familiares y Escolares de la US, que coordina el profesor Alfredo Oliva, trabajan en una nueva línea de investigación con la que quieren completar este estudio centrándose en lo que Jeffrey Jensen Arnett, profesor de psicología de la Universidad



Clarck en Worcester, denomina 'adulthood emergente'.

A esta cuestión quiere dar respuesta el proyecto Transición a la Adulthood en España (TAE) que lleva a cabo un equipo de seis investigadores de las Universidades de Sevilla y del País Vasco (UPV/EHU) con el asesoramiento del profesor Arnett.

Tanto la adulthood como la adolescencia no está determinada por una edad concreta sino que depende directamente del contexto socioeconómico y cultural de cada país

TAE persigue describir cómo son estos jóvenes, determinar qué factores de riesgo y de protección poseen, y elaborar un documento que sirva de guía de orientación para mejorar su desarrollo individual, sus relaciones personales y familiares y promover jóvenes socialmente más competentes. Para ello, se ha recogido un total de 1.400 testimonios de estudiantes de la Universidad de Sevilla y de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

“Es una etapa poco estudiada desde el punto de vista científico pero de gran trascendencia porque supone la antesala del mundo adulto, y en ella los y las jóvenes irán adquiriendo responsabilidades y tomando decisiones que condicionarán en gran parte su futuro”, defiende la profesora Sánchez, quién además se plantea si hoy día los alumnos universitarios son de verdad adultos más allá de ser mayores de edad ante la ley.

Como señalan los expertos, tanto la adulthood como la adolescencia no está determinada por una edad concreta sino que depende directamente del contexto socioeconómico y cultural de cada país, esto conlleva que en los países desarrollados cada vez se atrase más la entrada en el mundo adulto con las responsabilidades y compromisos que ello conlleva.

Referencias bibliográficas:

Sánchez-Queija, I, Oliva, A, Parra, A, Camacho, C (2015, publicación on-line). Longitudinal Analysis of the Role of Family Functioning in Substance Use. *Journal of Child and Family Studies*. DOI 10.1007/s10826-015-0212-9

Parra, A., Oliva, A. y Reina, M.C. (en prensa). Family relationships from adolescence to emerging adulthood: A longitudinal study. *Journal of Family Issues*.

Parra, A., Oliva, A., y Sánchez-Queija (2015). Development of emotional autonomy from adolescence to young adulthood in Spain. *Journal of Adolescence*, 38, 57-67.



Los adolescentes con madres menos afectuosas tienden a consumir más drogas



Los adolescentes con madres más afectuosas tienden a consumir menos drogas, como el alcohol o el tabaco, que los jóvenes que tienen una relación más distante o fría con su madre, según un estudio de la **Universidad de Sevilla**. La investigación, realizada por un grupo de expertos de la **Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación** y recogida por la **Agencia SINC**, ha descubierto que las relaciones de los hijos con sus padres son "muy importantes" e influyentes en el consumo de drogas. De esta forma, los jóvenes que viven en una familia poco cohesionada tienden a consumir más alcohol, tabaco o cannabis.

Las profesoras de la Universidad de Sevilla, Agueda Parra e Inmaculada Sánchez, han afirmado que "en España, para tener un buen desarrollo, los jóvenes no necesitan distanciarse emocionalmente de sus padres y madres, cosa que sí ocurre en otros lugares del mundo como Estados Unidos o países anglosajones, donde la autonomía emocional es más necesaria".

Para este estudio, se llevó a cabo una investigación longitudinal

a lo largo de diez años durante los cuales se ha entrevistado a 90 estudiantes de la provincia de Sevilla cuando tenían 13, 15, 17 y 21 años. El objetivo era estudiar la evolución de los adolescentes de diferentes entornos y niveles socioeconómicos.

Ser mayor de edad no es ser adulto

Parra y Sánchez, junto al profesor Alfredo Oliva, han puesto en marcha una nueva línea de investigación para investigar qué factores de riesgo y protección influyen en la transición a la adultez en España. En este sentido, la profesora Sánchez ha señalado que la adultez no depende de la edad, sino del contexto socioeconómico y cultural de cada país.

La transición a la edad adulta "es una etapa poco estudiada desde el punto de vista científico pero de gran trascendencia, porque supone la antesala del mundo adulto y, en ella, los jóvenes y las jóvenes irán adquiriendo responsabilidades y tomando decisiones que condicionarán gran parte de su futuro", ha afirmado Sánchez.

El objetivo del estudio, para el que se han recogido un total de 1.400 testimonios, es elaborar una guía de orientación para mejorar el desarrollo individual y las relaciones personales y familiares de los jóvenes.



Los adolescentes con madres menos afectuosas tienden a consumir más drogas como el alcohol o el tabaco



Publicidad

Los adolescentes con madres más afectuosas tienden a consumir menos drogas, como el alcohol o el tabaco, que los jóvenes que tienen una relación más distante o fría con su madre, según un estudio de la [Universidad de Sevilla](#).

La investigación, realizada por un grupo de expertos de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y recogida por la Agencia SINC, ha descubierto que las relaciones de los hijos con sus padres son "muy importantes" e influyentes en el consumo de drogas. De esta forma, los jóvenes que viven en una familia poco cohesionada tienden a consumir más alcohol, tabaco o cannabis.

Las profesoras de la Universidad de Sevilla, Águeda Parra e Inmaculada Sánchez, han afirmado que "en España, para tener un buen desarrollo, los jóvenes no necesitan distanciarse emocionalmente de sus padres y madres, cosa que sí ocurre en otros lugares del mundo como Estados Unidos o países anglosajones, donde la autonomía emocional es más necesaria".

Para este estudio, se llevó a cabo una investigación longitudinal a lo largo de diez años durante los cuales se ha entrevistado a 90 estudiantes de la provincia de Sevilla cuando tenían 13, 15, 17 y 21 años. El objetivo era estudiar la evolución de los adolescentes de diferentes entornos y niveles socioeconómicos.

Parra y Sánchez, junto al profesor Alfredo Oliva, han puesto en marcha una nueva línea de investigación para investigar qué factores de riesgo y protección influyen en la transición a la adultez en España. En este sentido, la profesora Sánchez ha señalado que la adultez no depende de la edad, sino del contexto socioeconómico y cultural de cada país.

La transición a la edad adulta "es una etapa poco estudiada desde el punto de vista científico pero de gran trascendencia, porque supone la antesala del mundo adulto y, en ella, los jóvenes y las jóvenes irán adquiriendo responsabilidades y tomando decisiones que condicionarán gran parte de su futuro", ha afirmado Sánchez.

El objetivo del estudio, para el que se han recogido un total de 1.400 testimonios, es elaborar una guía de orientación para mejorar el desarrollo individual y las relaciones personales y familiares de los jóvenes.



Los adolescentes más distanciados de sus madres son los que consumen más drogas

Publicado 11/08/2015 14:05:11 CET



FLICKER/POLDAVO (ALEX)
MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los adolescentes con madres más afectuosas tienden a consumir menos drogas, como el alcohol o el tabaco, que los jóvenes que tienen una relación más distante o fría con su madre, según un estudio de la [Universidad de Sevilla](#).

La investigación, realizada por un grupo de expertos de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y recogida por la Agencia SINC, ha descubierto que las relaciones de los hijos con sus padres son "muy importantes" e influyentes en el consumo de drogas. De esta forma, los jóvenes que viven en una familia poco cohesionada tienden a consumir más alcohol, tabaco o cannabis.

Las profesoras de la Universidad de Sevilla, Águeda Parra e Inmaculada Sánchez, han afirmado que "en España, para tener un buen desarrollo, los jóvenes no necesitan distanciarse emocionalmente de sus padres y madres, cosa que sí ocurre en otros lugares del mundo como Estados Unidos o países anglosajones, donde la autonomía emocional es más necesaria".

Para este estudio, se llevó a cabo una investigación longitudinal a lo largo de diez años durante los cuales se ha entrevistado a 90 estudiantes de la provincia de Sevilla cuando tenían 13, 15, 17 y 21 años. El objetivo era estudiar la evolución de los adolescentes de diferentes entornos y niveles socioeconómicos.

SER MAYOR DE EDAD NO ES SER ADULTO

Parra y Sánchez, junto al profesor Alfredo Oliva, han puesto en marcha una nueva línea de investigación para investigar qué factores de riesgo y protección influyen en la transición a la adultez en España. En este sentido, la profesora Sánchez ha señalado que la adultez no depende de la edad, sino del contexto socioeconómico y cultural de cada país.

La transición a la edad adulta "es una etapa poco estudiada desde el punto de vista científico pero de gran



trascendencia, porque supone la antesala del mundo adulto y, en ella, los jóvenes y las jóvenes irán adquiriendo responsabilidades y tomando decisiones que condicionarán gran parte de su futuro", ha afirmado Sánchez.

El objetivo del estudio, para el que se han recogido un total de 1.400 testimonios, es elaborar una guía de orientación para mejorar el desarrollo individual y las relaciones personales y familiares de los jóvenes.



Los adolescentes con madres menos afectuosas tienden a consumir más drogas como el alcohol o el tabaco

| 11/08/2015 - 14:03



Puntúa la noticia :

Nota de los usuarios: - (0 votos)

Más noticias sobre:

- Drogas

Sevilla

- Tabaco



Enlaces relacionados

Rsc. los partidos políticos anuncian medidas para "incorporar la ética al sistema productivo" (23/07)

Seguir a @elecodiario

Los adolescentes con madres más afectuosas tienden a consumir menos drogas, como el alcohol o el tabaco, que los jóvenes que tienen una relación más distante o fría con su madre, según un estudio de la [Universidad de Sevilla](#).

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La investigación, realizada por un grupo de expertos de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y recogida por la Agencia SINC, ha descubierto que las relaciones de los hijos con sus padres son "muy importantes" e influyentes en el consumo de drogas. De esta forma, los jóvenes que viven en una familia poco cohesionada tienden a consumir más alcohol, tabaco o cannabis.

Las profesoras de la Universidad de Sevilla, Águeda Parra e Inmaculada Sánchez, han afirmado que "en España, para tener un buen desarrollo, los jóvenes no necesitan distanciarse emocionalmente de sus padres y madres, cosa que sí ocurre en otros lugares del mundo como Estados Unidos o países anglosajones, donde la autonomía emocional es más necesaria".

Para este estudio, se llevó a cabo una investigación longitudinal a lo largo de diez años durante los cuales se ha entrevistado a 90 estudiantes de la provincia de Sevilla cuando tenían 13, 15, 17 y 21 años. El objetivo era estudiar la evolución de los adolescentes de diferentes entornos y niveles socioeconómicos.

SER MAYOR DE EDAD NO ES SER ADULTO

Parra y Sánchez, junto al profesor Alfredo Oliva, han puesto en marcha una nueva línea de investigación para investigar qué factores de riesgo y protección influyen en la transición a la adultez en España. En este sentido, la profesora Sánchez ha señalado que la adultez no depende de la edad, sino del contexto socioeconómico y cultural de cada país.

La transición a la edad adulta "es una etapa poco estudiada desde el punto de vista científico pero de gran trascendencia, porque supone la antesala del mundo adulto y, en ella, los jóvenes y las jóvenes irán adquiriendo responsabilidades y tomando decisiones que condicionarán gran parte de su futuro", ha afirmado Sánchez.

El objetivo del estudio, para el que se han recogido un total de 1.400 testimonios, es elaborar una guía de orientación para mejorar el desarrollo individual y las relaciones personales y familiares de los jóvenes.

- España
- Salud



Nieto.

Aunque el riesgo de melanoma aumenta con la edad, una característica de este cáncer es la elevada proporción de casos que se diagnostican en menores de 40 años. Sin embargo, son los pacientes mayores de 60 años quienes suelen presentar diagnósticos más tardíos con lesiones más profundas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las personas que se exponen de forma excesiva a las radiaciones ultravioletas tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de piel. Los cánceres de piel pueden prevenirse mediante medidas sencillas como evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día (entre las 12 y las 16 horas), utilizar gorras, sombreros o sombrillas para que el sol no llegue a la piel, y aplicar sobre la piel fotoprotectores solares con filtros de protección UVA y UVB adecuados a cada tipo de piel.

"Aunque las características genéticas de cada persona también influyen, evitar la exposición inadecuada al sol o a otras fuentes artificiales de ultravioletas como las lámparas de las cabinas bronceadoras, ayudará a disminuir la aparición de tumores cutáneos y en el caso del melanoma es especialmente importante evitar la exposición aguda e intermitente al sol, que causa quemaduras solares, sobretodo en la infancia y adolescencia", ha concluido la investigadora.



PUBLICIDAD

HEMEROTECA PROMOCIONES SUPLEMENTOS AUDIOS FOTOS ENCUESTAS ANUNCIOS TITULARES LOTERÍAS

EL DÍAesBusca 

Canarias La Palma Tenerife Economía Nacional Sociedad Deportes Cultura Criterios

NOTICIAS DE AGENCIAS

11/08/2015 13:04

Los adolescentes con madres menos afectuosas tienden a consumir más drogas como el alcohol o el tabaco

Madrid, Europa Press Los adolescentes con madres más afectuosas tienden a consumir menos drogas, como el alcohol o el tabaco, que los jóvenes que tienen una relación más distante o fría con su madre, según un estudio de la Universidad de Sevilla.

La investigación, realizada por un grupo de expertos de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y recogida por la Agencia SINC, ha descubierto que las relaciones de los hijos con sus padres son "muy importantes" e influyentes en el consumo de drogas. De esta forma, los jóvenes que viven en una familia poco cohesionada tienden a consumir más alcohol, tabaco o cannabis.

Las profesoras de la Universidad de Sevilla, Águeda Parra e Inmaculada Sánchez, han afirmado que "en España, para tener un buen desarrollo, los jóvenes no necesitan distanciarse emocionalmente de sus padres y madres, cosa que sí ocurre en otros lugares del mundo como Estados Unidos o países anglosajones, donde la autonomía emocional es más necesaria".

Para este estudio, se llevó a cabo una investigación longitudinal a lo largo de diez años durante los cuales se ha entrevistado a 90 estudiantes de la provincia de Sevilla cuando tenían 13, 15, 17 y 21 años. El objetivo era estudiar la evolución de los adolescentes de diferentes entornos y niveles socioeconómicos.

SER MAYOR DE EDAD NO ES SER ADULTO

Parra y Sánchez, junto al profesor Alfredo Oliva, han puesto en marcha una nueva línea de investigación para investigar qué factores de riesgo y protección influyen en la transición a la adultez en España. En este sentido, la profesora Sánchez ha señalado que la adultez no depende de la edad, sino del contexto socioeconómico y cultural de cada país.

La transición a la edad adulta "es una etapa poco estudiada desde el punto de vista científico pero de gran trascendencia, porque supone la antesala del mundo adulto y, en ella, los jóvenes y las jóvenes irán adquiriendo responsabilidades y tomando decisiones que condicionarán gran parte de su futuro", ha afirmado Sánchez.

El objetivo del estudio, para el que se han recogido un total de 1.400 testimonios, es elaborar una guía de orientación para mejorar el desarrollo individual y las relaciones personales y familiares de los jóvenes.

Twitter

PUBLICIDAD



¡Síguenos!

Destacamos ► [Escarlatina](#) [Menopausia](#) [Síndrome Munchausen](#) [Hidrocefalia](#) [Ganglios](#) [Pomelo](#) [Benzodiacepinas](#) [Resiliencia](#) [Piercing](#)

Editado por europa **press**

11 de Agosto 2015

infosalus.com

[SALUD](#) [FARMACIA](#) [ACTUALIDAD](#) [MUJER](#) [NUTRICIÓN](#) [ESTÉTICA](#) [ASISTENCIA](#) [MAYORES](#) [ENFERMEDADES](#)

— COMO ALCOHOL, TABACO O CANNABIS —

Los adolescentes más distanciados de sus madres son los que consumen más drogas



FLICKER/POLDAVO (ALEX)

Publicado 11/08/2015 14:03:49 CET

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los adolescentes con madres más afectuosas tienden a consumir menos drogas, como el alcohol o el tabaco, que los jóvenes que tienen una relación más distante o fría con su madre, según un estudio de la Universidad de Sevilla.

La investigación, realizada por un grupo de expertos de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y recogida por la Agencia SINC, ha descubierto que **las relaciones de los hijos con sus padres son "muy importantes" e influyentes en el consumo de drogas.** De esta forma, **los jóvenes que viven en una familia poco cohesionada tienden a consumir más alcohol, tabaco o cannabis.**

Las profesoras de la Universidad de Sevilla, Águeda Parra e Inmaculada Sánchez, han afirmado que *"en España, para tener un buen desarrollo, los jóvenes no necesitan*

Lo más leído en...

Infosalus



1 [Cuidado con los remedios caseros para blanquear los dientes](#)



2 [Dar a luz en tu propia casa, y con cargo a la sanidad pública](#)



3 [Resiliencia en familia para convivir con la discapacidad](#)



4 [¿Te huelen los pies?](#)



5 [Modelos matemáticos para conocer mejor la memoria humana](#)

Hoy

Una semana

Un mes

Últimas noticias de salud



distanciarse emocionalmente de sus padres y madres, cosa que sí ocurre en otros lugares del mundo como Estados Unidos o países anglosajones, donde la autonomía emocional es más necesaria".

Para este estudio, se llevó a cabo una investigación longitudinal a lo largo de diez años durante los cuales se ha entrevistado a 90 estudiantes de la provincia de Sevilla cuando tenían 13, 15, 17 y 21 años. El objetivo era estudiar la evolución de los adolescentes de diferentes entornos y niveles socioeconómicos.

SER MAYOR DE EDAD NO ES SER ADULTO

Parra y Sánchez, junto al profesor Alfredo Oliva, han puesto en marcha una nueva línea de investigación para investigar qué factores de riesgo y protección influyen en la transición a la adultez en España. En este sentido, la profesora Sánchez ha señalado que **la adultez no depende de la edad, sino del contexto socioeconómico y cultural de cada país.**

La transición a la edad adulta *"es una etapa poco estudiada desde el punto de vista científico pero de gran trascendencia, porque supone la antesala del mundo adulto y, en ella, los jóvenes y las jóvenes irán adquiriendo responsabilidades y tomando decisiones que condicionarán gran parte de su futuro"*, ha afirmado Sánchez.

El objetivo del estudio, para el que se han recogido un total de 1.400 testimonios, es elaborar una guía de orientación para mejorar el desarrollo individual y las relaciones personales y familiares de los jóvenes.

Directorio: Sevilla Universidad de Sevilla Universidad Psicología

[Sigue a @infosalus.com](#)

Unos 75.000 niños con VIH y SIDA en Kenia no tienen acceso a la medicación

Cirugía robótica para trasplantar un riñón

Limpieza para evitar infecciones en hospitales ¿Cuál es el mejor método?

Diagnóstico precoz, clave para un buen pronóstico del cáncer de próstata

Los pacientes con cáncer de próstata tratados con braquiterapia tienen un mayor bienestar

Los británicos donan más en España que en Reino Unido

Noticias Recomendadas

Cuidado con los remedios caseros para blanquear los dientes

Dar a luz en tu propia casa, y con cargo a la sanidad...

Resiliencia en familia para convivir con la discapacidad

¿Te huelen los pies?



ELSEMANALDIGITAL.COM

Pronto **es** diario

[España](#)
[Mundo](#)
[Economía](#)
[Motor](#)
[Medios](#)
[Deportes](#)
[Blogs](#)
[Reportajes](#)

Galería de fotos · Hemeroteca · RSS · El tiempo · Traductor

[f Siguenos](#)
[t Sigue](#)

11 agosto 2015. Actualizado 14:06

Director: Antonio M. Be...

NINGO -- ÚLTIMA HORA

Los adolescentes con madres menos afectuosas tienden a consumir más drogas como el alcohol o el tabaco

El Semanal Digital

Los adolescentes con madres más afectuosas tienden a consumir menos drogas, como el alcohol o el tabaco, que los jóvenes que tienen una relación más distante o fría con su madre, según un estudio de la Universidad de Sevilla.

11 de agosto de 2015

Los adolescentes con madres más afectuosas tienden a consumir menos drogas, como el alcohol o el tabaco, que los jóvenes que tienen una relación más distante o fría con su madre, según un estudio de la Universidad de Sevilla.



La investigación, realizada por un grupo de expertos de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y recogida por la Agencia SINC, ha descubierto que las relaciones de los hijos con sus padres son "muy importantes" e influyentes en el consumo de drogas. De esta forma, los jóvenes que viven en una familia poco cohesionada tienden a consumir más alcohol, tabaco o cannabis.

Las profesoras de la Universidad de Sevilla, Águeda Parra e Inmaculada Sánchez, han afirmado que "en España, para tener un buen desarrollo, los jóvenes no necesitan distanciarse emocionalmente de sus padres y madres, cosa que sí ocurre en otros lugares del mundo como Estados Unidos o países anglosajones, donde la autonomía emocional es más necesaria".

Para este estudio, se llevó a cabo una investigación longitudinal a lo largo de diez años durante los cuales se ha entrevistado a 90 estudiantes de la provincia de Sevilla cuando tenían 13, 15, 17 y 21 años. El objetivo era estudiar la evolución de los adolescentes de diferentes entornos y niveles socioeconómicos.

SER MAYOR DE EDAD NO ES SER ADULTO

Parra y Sánchez, junto al profesor Alfredo Oliva, han puesto en marcha una nueva línea de investigación para investigar qué factores de riesgo y protección influyen en la transición a la adultez en España. En este sentido, la profesora Sánchez ha señalado que la adultez no depende de la edad, sino del contexto socioeconómico y cultural de cada país.

La transición a la edad adulta "es una etapa poco estudiada desde el punto de vista científico pero de gran trascendencia, porque supone la antesala del mundo adulto y, en ella, los jóvenes y las jóvenes irán adquiriendo responsabilidades y tomando decisiones que condicionarán gran parte de su futuro", ha afirmado Sánchez.

El objetivo del estudio, para el que se han recogido un total de 1.400 testimonios, es elaborar una guía de orientación para mejorar el desarrollo individual y las relaciones personales y familiares de los jóvenes.

▲ IR ARRIBA

¿Te ha gustado este artículo? Coméntaselo a tus amigos y conocidos:



+Renfe +Cerca

renfe



[f Siguenos en Facebook](#)
[t Siguenos en Twit](#)

ÚLTIMA HORA + TITUL

14:03 Los adolescentes con madres menos afectuosas tienden a consumir más drogas como el alcohol o el tabaco

13:43 AV.- C-LM eliminará la concurrencia competitiva para adquirir libros de texto en cursos de implantación de la LOMCE

13:42 DDHH.- World Vision alerta de la necesidad de ayuda humanitaria en países e situaciones de conflicto bélico y sequías

13:40 Los 'drones' no deben sobrevolar parques, playas, conciertos o procesiones

13:39 Kenia.- Aproximadamente 75.000 niños con VIH y SIDA no tienen acceso a los medicamentos antirretrovirales

13:39 Kenia.- Aproximadamente 75.000 niños con VIH y SIDA no tienen acceso a los medicamentos antirretrovirales

13:01 Bildu, cuestiona la pancarta de ETA e



La relación entre el jiente y el caballo, clave para medir el rendimiento del animal

UCC-i | Seguir a @cienciaUS | 11 agosto 2015 10:02



A la hora de predecir el potencial genético para la doma clásica de los caballos PRE, los expertos tienen en cuenta la ganadería a la que pertenecen, el tipo de concurso en el que participan, el sexo del animal, el estrés que les produce el viaje hasta centro hípico y el nivel de entrenamiento previo.

Por primera vez, también se ha tenido en cuenta el jinete que lo monta y la interacción de éste con el propio caballo, ya que son factores fundamentales para la expresión del valor genético del animal, como ha revelado este estudio realizado en colaboración con profesores del [Grupo de Investigación de Nuevas Tecnologías de Mejora Animal y de Sus Sistemas Productivos \(MERAGEM\) de la Universidad de Sevilla](#), liderado por la profesora [Mercedes Valera](#), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Córdoba.

Según la normativa actual los caballos pueden obtener la categoría genética de Joven Reproductor Recomendado, si poseen un valor genético mayor que la media de la población; de Mejorante, con valor genético por encima de la media poblacional y una fiabilidad de la estima mayor o igual al 60%; y de Élite, que es un caballo Mejorante tanto para la disciplina de doma clásica como para la conformación funcional.

La información facilitada por el grupo de investigación se recoge en una serie de catálogos que se publican en más de 60 países de todo el mundo

Toda la información de los animales con categoría genética se publica anualmente en los Catálogos de Reproductores, que proporcionan una información fundamental a los ganaderos a la hora de adquirir animales o para diseñar el cuadro de apareamientos de su yeguada.

Estos catálogos están también muy extendidos en otras especies y razas ganaderas, ya que es una fuente de ayuda al ganadero, en el momento de decidir qué ejemplar usar para conseguir mejora en la descendencia de su ganadería, tanto desde el punto de vista productivo, funcional o de conformación (corrección de cuellos, espaldas, grupas, etc.).



“Si una ganadería posee caballos con problemas en el paso, le recomendamos introducir un animal con un alto valor genético en este aire, con objeto de tener descendientes que muestren en los concursos un rendimiento alto para este tipo de movimiento”, explica Valera.

El valor genético del caballo triplica su valor de venta

Por todo ello es fundamental realizar valoraciones genéticas con modelos lo más fiables posibles. “La categoría genética que se le otorga a un animal, en función de su valor genético, puede incluso triplicar su valor de venta, por eso es fundamental diseñar modelos de evaluación fiables”, apunta la Dra. Valera.

Hasta este momento todos los especialistas eran cocientes de la importancia del binomio jinete y caballo, tanto como del propio caballo, de forma que un buen jinete puede mejorar el rendimiento de un caballo mediocre, y a la inversa un buen caballo puede no obtener los resultados deseados si el jinete no es experimentado o si su relación con el jinete no es buena.

En este estudio se han recabado los datos de participación en competiciones de doma de 8 años (2004 a 2011) de caballos de Pura Raza Español

En este estudio se han recabado los datos de participación en competiciones de doma de 8 años (2004 a 2011) de caballos de Pura Raza Español, y se han puesto a punto modelos que incluyen la influencia en el comportamiento del caballo del jinete y de la interacción jinete-caballo, consiguiendo un nivel predictivo muy elevado (hasta del 70%).

La información facilitada por el grupo de investigación se recoge en una serie de catálogos que se publican en más de 60 países de todo el mundo. También llevan a cabo evaluaciones genéticas con Caballos de Deporte Español, reproductores de la raza Anglo-árabe, caballos de Pura Raza Árabe, de Pura Raza Menorquina y Trotador español.

Referencia bibliográfica:

Sánchez Guerrero, M.J., Cervantes, I., Valera, M., Gutiérrez, J.P. Modelling genetic evaluation for dressage in Pura Raza Español horses with focus on the rider effect. *Journal of Animal Breeding and Genetics* 131 (5): 395–402.



La relación entre el jinete y el caballo, clave para medir el rendimiento del animal »

UCC+i| Seguir a @cienciaUS |11 agosto 2015 10:02

A la hora de predecir el potencial genético para la doma clásica de los caballos PRE, los expertos tienen en cuenta la ganadería a la que pertenecen, el tipo de concurso en el que participan, el sexo del animal, el estrés que les produce el viaje hasta centro hípico y el nivel de entrenamiento previo.

Por primera vez, también se ha tenido en cuenta el jinete que lo monta y la interacción de éste con el propio caballo, ya que son factores fundamentales para la expresión del valor genético del animal, como ha revelado este estudio realizado en colaboración con profesores del Grupo de Investigación de Nuevas Tecnologías de Mejora Animal y de Sus Sistemas Productivos (MERAGEM) de la **Universidad de Sevilla, liderado por la profesora Mercedes Valera**, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Córdoba.

Según la normativa actual los caballos pueden obtener la categoría genética de Joven Reproductor Recomendado, si poseen un valor genético mayor que la media de la población; de Mejorante, con valor genético por encima de la media poblacional y una fiabilidad de la estima mayor o igual al 60%; y de Élite, que es un caballo Mejorante tanto para la disciplina de doma clásica como para la conformación funcional.

La información facilitada por el grupo de investigación se recoge en una serie de catálogos que se publican en más de 60 países de todo el mundo

Toda la información de los animales con categoría genética se publica anualmente en los Catálogos de Reproductores, que proporcionan una información fundamental a los ganaderos a la hora de adquirir animales o para diseñar el cuadro de apareamientos de su yeguada.

Estos catálogos están también muy extendidos en otras especies y razas ganaderas, ya que es una fuente de ayuda al ganadero, en el momento de decidir qué ejemplar usar para conseguir mejora en la descendencia de su ganadería, tanto desde el punto de vista productivo, funcional o de conformación (corrección de cuellos, espaldas, grupas, etc.).

“Si una ganadería posee caballos con problemas en el paso, le recomendamos introducir un animal con un alto valor genético en este aire, con objeto de tener descendientes que muestren en los concursos un rendimiento alto para este tipo de movimiento”, explica Valera.

El valor genético del caballo triplica su valor de venta

Por todo ello es fundamental realizar valoraciones genéticas con modelos lo más fiables posibles. “La categoría genética que se le otorga a un animal, en función de su valor genético, puede incluso triplicar su valor de venta, por eso es fundamental diseñar modelos de evaluación fiables”, apunta la Dra. Valera.

Hasta este momento todos los especialistas eran cocientes de la importancia del binomio jinete y caballo, tanto como del propio caballo, de forma que un buen jinete puede mejorar el rendimiento de un caballo mediocre, y a la inversa un buen caballo puede no obtener los resultados deseados si el jinete no es experimentado o si su relación con el jinete no es buena.

En este estudio se han recabado los datos de participación en competiciones de doma de 8 años (2004 a 2011) de caballos de Pura Raza Español

En este estudio se han recabado los datos de participación en competiciones de doma de 8 años (2004 a 2011) de caballos de Pura Raza Español, y se han puesto a punto modelos que incluyen la influencia en el comportamiento del caballo del jinete y de la interacción jinete-caballo, consiguiendo un nivel predictivo muy elevado (hasta del 70%).

La información facilitada por el grupo de investigación se recoge en una serie de catálogos que se publican en más de 60 países de todo el mundo. También llevan a cabo evaluaciones genéticas con Caballos de Deporte Español, reproductores de la raza Anglo-árabe, caballos de Pura Raza Árabe, de Pura Raza Menorquina y Trotador español.

Referencia bibliográfica:

El toro de lidia tiene una información genética en el cromosoma Y única en el mundo

Investigadores de la **Universidad de Sevilla** estudian la contribución del toro de lidia al patrimonio genético español de bovino. Independientemente de las connotaciones ético-culturales que lleva asociadas, ocupa un lugar destacado en el ecosistema de la dehesa, contribuyendo junto con el cerdo ibérico y otras razas autóctonas, decididamente a su mantenimiento.

UCC+i US 10 agosto 2015 09:03



Toro de lidia. / [Wikipedia](#).

La raza del toro de lidia, también denominado toro bravo, ha conservado en gran medida el sistema productivo tradicional que tenía en los últimos siglos. A lo largo de su historia se ha diferenciado del vacuno de carne por su selección, en función de caracteres temperamentales de su comportamiento, independientemente de su tipo zootécnico (morfológico). Así, además de los caracteres morfológicos comunes en la raza de lidia, presentan gran diversidad de caracteres étnicos (tamaño, encornadura, capa etc.) en función del encaste del que deriven.

La raza de lidia está formada actualmente por cinco castas fundacionales (Gallardo, Vazqueña, Cabrera y Vistahermosa) y cerca de 20 subpoblaciones o encastes dentro de éstas. Los toros pertenecientes a cada una de estas castas fundacionales y a los encastes poseen, además de un constitución genética única, un patrón morfológico y temperamental propio, que hace inconfundibles a los toros de cada una de estas subpoblaciones.

Se han estudiado 38 haplotipos diferentes del cromosoma Y de 1.300 animales

Teniendo en cuenta estas peculiaridades, y tras realizar una comparación genética con 47 razas bovinas europeas, africanas y españolas, un estudio de la Universidad de Sevilla, junto con el Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba y el departamento de Investigación del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias, pone de manifiesto que la información genética que aporta el toro de lidia, a través del cromosoma Y, hace única a esta raza en el mundo.

En esta investigación, que se ha publicado la revista *Animal Genetics*, se han estudiado 38 haplotipos (combinación de alelos en lugares adyacentes en un cromosoma que se heredan juntos) diferentes del cromosoma Y de 1.300 animales, con el objetivo de ver la contribución genética de la raza de lidia al patrimonio genético del bovino, así como establecer medidas para su conservación y mejora genética.

“Según nuestros resultados se pueden encontrar grandes diferencias genéticas entre las distintas castas y encastes del toro de Lidia, incluso a veces más que las existentes entre distintas razas bovinas, por lo que la población de lidia debería ser considerada como una Agrupación Racial, más que como una única raza”, explica Rocío Pelayo, miembro del [grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías de Mejora Animal y de Sus Sistemas Productivos](#) de la Universidad de Sevilla (Grupo MERAGEM) y autora de este estudio, quien concreta que la casta Navarra, Gallardo (encaste Pablo Romero) y Cabrera (encaste Miura), además del encaste Albaserrada (Casta Vistahermosa) no se asemejan a ninguna raza estudiada hasta el momento, “por presentar haplotipos únicos en el mundo”.

“Hay que hacer grandes esfuerzos para que se conserve este patrimonio único que se encuentra en peligro de extinción y del que ya se han perdido algunas castas en España”, defiende la investigadora Pelayo, y que “en el toro de lidia, el encaste debería ser la unidad de trabajo a la hora de la conservación genética y de preservar el acervo genético único evidenciado en este trabajo”.

Este proyecto de investigación cuenta con la colaboración de la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas (AEGRB), y de otras Asociaciones de ganaderos de razas autóctonas y locales bovinas.

“Hay que hacer grandes esfuerzos para que se conserve este patrimonio único en peligro de extinción y del que ya se han perdido algunas castas”, explica Rocío Pelayo

Referencia bibliográfica:

[Contribution of Lidia cattle breed historical castes to the paternal genetic stock of Spain](#). Pelayo^{1,*}, M. Valera, A. Molina and L. J.

Royo. Publicado en *Animal Genetics* Volume 46, Issue 3, pages 312–315, junio de 2015

Zona geográfica: Andalucía

Fuente: UCC+i US



¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY



ABC

21:30

«Mi Capitán y Tony Love»

Actuará esta noche en el CAAC, dentro de la programación del ciclo «Nocturama Sevilla 2015», «Mi Capitán», una banda encabezada por Gonçal Planas junto a miembros de los grupos «Love of Lesbian» y «Standstill». En el aftershow pinchará Tony Love. Precio de la entrada 10 euros.

10:00

«Obsesión doméstica»

Últimos días para visitar esta exposición en el **Cicus** realizada por la fotógrafa belga, residente en Australia, Magdalena Bors, en la que nos muestra dos de sus series más emblemáticas: «Tierra natal» y «El séptimo día». Entrada libre.

21:30

«Las Bacantes»

En el Castillo de San Jorge (plaza del Altozano) Sennsa Teatro presenta esta obra en la que la creatividad, la calidad técnica y la emoción se dan la mano para interpretar esta conocida tragedia de Eurípides. Precio de la entrada 5,90 con Oferplan.

22:00

Magia en el Alamillo

Dentro del ciclo Veranillos del Alamillo, hoy se celebrará en el parque un espectáculo de ilusionismo para toda la

familia de la mano de Filiberto Chamorro. La entrada es gratuita.

22:15

«Asómate al Patio»

El patio de la Diputación acoge la proyección del largometraje «La historia de Marie Heurtin». Esta producción francesa narra una historia inspirada en hechos reales que sucedieron a finales del siglo XIX. La protagonista, la joven Marie, incapaz de comunicarse por ser sorda, muda y ciega, fue recluida por sus padres en un asilo a cargo de religiosas. Precio de la entrada 4 euros.

22:00

«La Estrella de Sevilla»

A la Torre de Don Fadrique (c/Becas s/n) llega esta obra de referencia del teatro del Siglo de Oro que representa la llegada del Rey Sancho el Bravo a Sevilla y aborda los conflictos históricos surgidos por el abuso de poder. Precio con Oferplan 8,90 euros.



CONVOCATORIAS

SEVILLA

HOY

OBRA CLÁSICA EN EL ESPACIO SANTA CLARA

22:00 · C/ BECAS Representación en la Torre de Don Fadrique de la obra *La estrella de Sevilla*, atribuida a Lope de Vega. Entradas a 12 y 15 euros en www.generaltickets.com y en las taquillas del Teatro Lope de Vega.

Patio de la Diputación

22:15 Proyección de la película *La historia de Marie Heurtin*, de Jean Pierre Ameris. Entradas a 4 euros. C/ Menéndez y Pelayo, 32.

Real Alcázar

22:30 Actuación del dúo Leo Rossi y Javier Núñez. Ambos músicos ofrecen el espectáculo *A violín e basso*. Entradas a 5 euros. Puerta de la Alcoba.

Cicus

22:30 Visionado de la película *Una giornata particolare*, de Ettore Scola. Entrada libre. Patio del Cicus. C/ Madre de Dios, 1.

Hospital de la Caridad

21:45 La compañía teatral Viento Sur representa la obra *Tiempo de burlas y entremeses*. Dirigen Antonio della Casa y Maite Lozano. Entradas a 10 euros. C/ Temprado, 3.

Parque de María Luisa

22:15 Exhibición del filme *La vida de Brian*, de Terry Jones. Entrada libre. Trasera del Pabellón Real.

Veranillos del Alamillo

21:30 Espectáculo de ilusionismo de la mano de Filiberto Chamorro. Entrada libre. Parque del Alamillo. Isla de la Cartuja.



Dirección de Comunicación

COMUNIDAD UNIVERSITARIA



Kieback&Peter celebra sus veinticinco años en el mercado español

El pasado 23 de junio, Kieback&Peter Ibérica ha celebrado su XXV aniversario del inicio de su actividad en el mercado español.

El evento contó con la presencia de un buen número de clientes que han sido testigos de la evolución de Kieback&Peter a lo largo de estos años y también de una nutrida representación de las asociaciones profesionales del sector, medios de comunicación especializados y la totalidad de la plantilla de la empresa en España

El director general de la filial en España, Eugenio de Miguel, explicó el desarrollo histórico de la matriz desde su fundación en Berlín en 1927 e hizo un resumen de estos veinticinco años en el mercado español; destacando que durante este tiempo la empresa se ha ido adaptado día a día a los cambios del mercado mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios que dieran satisfacción a las necesidades que iban apareciendo, al tiempo que ofrecieran nuevas ventajas y beneficios a los profesionales.

Posteriormente Michael Schmidt, director general de ventas de Kieback&Peter, GmbH dirigió unas palabras a los asistentes. "Las soluciones innovadoras siempre han caracterizado a la compañía, además de la apuesta por el I+D+i. Nuestro objetivo es reducir el consumo energético de los edificios y mejorar nuestro entorno" resaltó.

El acto prosiguió con la conferencia del **catedrático de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla, Ramón Velázquez Vila**, sobre la necesidad de reducir el consumo energético, titulada: "¿Es sostenible un crecimiento sostenido?".

Finalmente todos los asistentes pudieron disfrutar de las maravillosas vistas de Madrid, desde la planta 28 del hotel Eurostars Madrid Tower durante el coctel que se sirvió a continuación. ■

